


**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

5

**PRIORITY  
DOCUMENT**SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

09/485292

**Bescheinigung**

Die SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT in Berlin/Deutschland hat eine  
Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Neue (C1-C6)-Fragmente, Verfahren zur Herstellung  
und ihre Verwendung zur Synthese von Epothilon  
und Epothilonderivaten"

am 9. August 1997 beim Deutschen Patentamt eingereicht.

Das angeheftete Stück ist eine richtige und genaue Wiedergabe  
der ursprünglichen Unterlage dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patentamt vorläufig die Symbo-  
le C 07 D und C 07 C der Internationalen Patentklassifikation  
erhalten.

München, den 25. September 1998  
Der Präsident des Deutschen Patentamts  
Im Auftrag


Patenzzeichen: 197 35 578.1

09/485292

## Neue (C1-C6)-Fragmente, Verfahren zur Herstellung und ihre Verwendung zur Synthese von Epothilon und Epothilonderivaten

Die Erfindung betrifft den in den Patentansprüchen gekennzeichneten Gegenstand, das  
5 heißt neue (C1-C6)-Fragmente, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur  
Synthese von Epothilon und Epothilonderivaten.

Von Höfle et al. wird die cytotoxische Wirkung der Naturstoffe Epothilon A (R =  
10 Wasserstoff) und Epothilon B (R = Methyl)




R = H, CH<sub>3</sub>

15 z.B. in Angew. Chem. 1996, 108, 1671-1673 beschrieben. Wegen der in-vitro-  
Selektivität gegenüber Brust- und Darmzelllinien und ihrer im Vergleich zu Taxol  
deutlich höheren Aktivität gegen P-Glycoprotein-bildende, multiresistente Tumorzellen  
sowie ihre physikalischen Eigenschaften erscheint diese Strukturklasse für die  
Entwicklung eines Arzneimittels besonders interessant.

20

Es ist bekannt, daß die Verbindung der Formel



(II)

25 von Schinzer et al. ( Chem. Eur. J. 1996, 2, No. 11, 1478 ) zur Synthese von Epothilon  
und deren Derivaten verwendet werden kann.

Die Synthese von Schinzer et al. hat den Nachteil, daß die Gesamtausbeute mit 10,5%  
sehr niedrig ist und der Enantiomerenüberschuß bei 80% ee liegt.


Für eine industriell verwertbare Synthese sind hohe Ausbeuten und bessere Enantiomerenüberschüsse notwendig, d. h. eine hohe optische Reinheit.

5 Daher war die Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Synthese bereitzustellen, die die vorgenannten Nachteile nicht aufweist.

Es wurde nun gefunden, daß die Verbindung der Formel (II) aus Pantolacton in großen Mengen mit einer optischen Reinheit > 98% ee hergestellt werden kann.


10 Die Synthese wird im folgenden am Beispiel des käuflichen D-(-)-Pantolactons (für  $R^5$  und  $R^6$  = Methyl) beschrieben:

In einem Schritt 1




20 wird die freie Hydroxygruppe des Pantolactons (III) geschützt, indem man diese beispielsweise unter wasserfreien Bedingungen mit 3,4-Dihydro-2H-pyran/p-Toluolsulfonsäure-Pyridiniumsalz (a) in den Tetrahydropyranylether (IV) überführt und das Lacton bei -70°C mit Diisobutylaluminiumhydrid (b) zum Lactol (V) reduziert.

In einem Schritt 2




30 wird das Lactol (V) z. B. mit Methyltriphenylphosphoniumbromid/Butyllithium ( c ) geöffnet und gleichzeitig Wasser eliminiert zur offenkettigen Verbindung (VI).

In einem Schritt 3


- 5 wird die freie primäre Hydroxygruppe z. B. mit tert. Butyldiphenylsilylchlorid/Imidazol in Dimethylformamid (d) zur Verbindung (VII) mit zwei geschützten Hydroxygruppen umgesetzt.

In einem Schritt 4


10



- 15 wird der Tetrahydropyranylether unter Einwirkung von Pyridinium-p-Toluolsulfonat (e) gespalten, der Allylkohol (VIII) einer Hydroborierung unter üblichen Bedingungen (f) unterworfen und das erhaltene 1,3-Diol (IX) als Ketal (X) geschützt (g),  
oder


in einem Schritt 4a

- 20 wird zuerst eine Hydroborierung unter üblichen Bedingungen durchgeführt (x) und unter  
Einwirkung von Kupfer(II)sulfat/p-Toluolsulfonsäure und der Carbonylverbindung  
25  $R^7COR^8$  (y) der Tetrahydropyranylether gespalten und das Acetonid gebildet.

In einem Schritt 5

5

wird die Schutzgruppe der primären Hydroxygruppe der Verbindung (X) mit Tetrabutylammoniumfluorid (h) gespalten und der Alkohol (XI) z. B. mit Oxalylchlorid/Dimethylsulfoxid (i) zum Aldehyd (XII) oxidiert.

10 In einem Schritt 6

15 wird der Aldehyd (XII) mit einer metallorganischen Verbindung der allgemeinen Formel



wobei  $R^1$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl, Aryl oder  $C_7$ - $C_{20}$ -Aralkyl,

20


Y Lithium oder  $MgX$  und

X Chlor, Brom oder Iod sein kann,

umgesetzt und der erhaltene Alkohol (XIII) mit Molekularsieb/N-Morpholino-N-Oxid/Tetrapropylammoniumperruthenat (l) zum Keton (XIV) oxidiert.

25

Gegebenenfalls kann in einem **Schritt 7**



5


mit Lithiumdiisopropylamid (LDA)/R<sup>2</sup>Z

wobei R<sup>2</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, Aryl oder C<sub>7</sub>-C<sub>20</sub>-Aralkyl und  
Z eine geeignete Abgangsgruppe sein kann,

10

ein Rest R<sup>2</sup> zu einer Verbindung (IIa) eingefügt werden,  
bevor die bereits bekannte Umsetzung mit dem Aldehyd der Formel (XV) zur  
Verbindung (XVI) erfolgt.

15




20

Gegebenenfalls kann die Umsetzung mit R<sup>2</sup>X und dem Aldehyd (XV) ( Chem. Eur. J.  
1996, 2, No. 11, 1478 ) auch in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.

Die Schutzgruppe für die Hydroxyfunktion der Verbindungen der Formeln V, VI, VII  
und VIIa, in den Reaktionsschemata als Tetrahydropyranylether dargestellt, kann auch  
jede dem Fachmann bekannte andere Schutzgruppe sein.

25

In **Schema 1** ist die neue Synthese am Beispiel des D-(-)-Pantolactons dargestellt:




Schema 1

Der Enantiomerenüberschuß der neuen Synthese beträgt 100% ee und die Gesamtausbeute konnte gegenüber Schinzer et al ( 10,5% Gesamtausbeute ) auf 25% verbessert werden.

- 5 Die Stereochemie am C3 (Epothilonzählweise) kann je nach verwendetem Pantolacton gesteuert werden. Das unnatürliche (-).Enantiomer ist ebenfalls käuflich oder kann nach bekannten Verfahren aus racemischen Pntolacton bzw. dessen Oxidationsprodukt hergestellt werden.
- 10 Eine Variation des zuletzt eingeführten Alkylteils am Keton (XII) ist durch Einsetzen anderer metallorganischer Verbindungen  $R^1MgX$  oder  $R^1Li$  zur Reaktion mit dem Aldehyd (XII) und gegebenenfalls zweiter Alkylierung des erhaltenen Ketons (XIV) mit Lithiumdiisopropylamid/  $R^2X$  möglich und führt zu einer Substituentenvariation am C6 des Epothilongerüstes.
- 15 Wie anhand der Beispiele 17 bis 19 gezeigt werden konnte, ist mit den Derivaten, die keinen direkten Zugang aus Pantolacton erlauben, ein „Quereinstieg“ in die erfindungsgemäße Synthese über die Verbindung der allgemeinen Formel (IXa) gemäß Anspruch 3 möglich. Die Synthese des Aldehyds der Formel (XV) ist in Chem. Eur. J.
- 20 1996, 2, No. 11, Seite 1478 beschrieben.

Die Erfindung betrifft weiter Verbindungen der allgemeinen Formel



(I)

25 worin

- $R^1$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl, Aryl oder  $C_7$ - $C_{20}$ -Aralkyl,
- $R^2$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl, Aryl oder  $C_7$ - $C_{20}$ -Aralkyl,
- $R^3$   $CH_2OH$ ,  $CH_2OR$ ,
- $R^4$  OH, OR,


- 30 wobei beide Reste R unabhängig voneinander eine beliebige Schutzgruppe oder gemeinsam eine  $-CR^7R^8$  Gruppe worin  $R^7$  und  $R^8$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl, Aryl oder gemeinsam eine  $-(CH_2)_n$ - Gruppe mit
- 35  $n = 2$  bis 6 bedeuten,



$R^5$  und  $R^6$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  
 $C_7$ - $C_{10}$ -Aralkyl oder gemeinsam eine  $-(CH_2)_m$ -Gruppe mit  
 $m = 2$  bis  $5$  bedeuten,

und alle Stereoisomeren sowie deren Gemische eingeschlossen sind,  
 5 und wenn  $R^1 =$  Wasserstoff und  $R^2 =$  Ethyl oder umgekehrt,  $R^3 = CH_2OR$ ,  $R^4 = OR$ ,  
 $R = CR^7R^8$  und  $R^7 = R^8 =$  Methyl ist, dürfen  $R^5$  und  $R^6$  nicht Methyl bedeuten;

weiter Verbindungen der Formel




10

(VIa)

worin  $R^5$  und  $R^6$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  
 $C_7$ - $C_{10}$ -Aralkyl oder gemeinsam eine  $-(CH_2)_m$ -Gruppe mit  
 $m = 2$  bis  $5$ , und

15  $R^9$  und  $R^{10}$  unabhängig voneinander Wasserstoff oder eine beliebige  
 Schutzgruppe

bedeuten und weiter Verbindungen der Formel



20

(IXa)

worin  $R^5$  und  $R^6$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  
 $C_7$ - $C_{10}$ -Aralkyl oder gemeinsam eine  $-(CH_2)_m$ -Gruppe mit  
 $m = 2$  bis  $5$ , und

25  $R^9$ ,  $R^{10}$  und  $R^{11}$  unabhängig voneinander Wasserstoff oder eine beliebige  
 Schutzgruppe

bedeuten.

Als Alkylgruppen  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^5$  und  $R^6$  sind gerad- oder verzweigt-kettige Alkylgruppen  
 30 mit 1-10 Kohlenstoffatomen zu betrachten, wie beispielsweise Methyl, Ethyl, Propyl,  
 Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert.-Butyl, Pentyl, Isopentyl, Neopentyl, Heptyl, Hexyl,  
 Decyl.

Als Alkylgruppen  $R^7$ ,  $R^8$  und B sind gerad- oder verzweigt-kettige Alkylgruppen mit 1-4 Kohlenstoffatomen zu betrachten, wie beispielsweise Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert.-Butyl.

- 5 Als Arylreste  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^7$  und  $R^8$  kommen substituierte und unsubstituierte carbocyclische oder heterocyclische Reste mit einem oder mehreren Heteroatomen, wie z.B. Phenyl, Naphtyl, Furyl, Thienyl, Pyridyl, Pyrazolyl, Pyrimidinyl, Oxazolyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Chinolyl, die mehrfach substituiert sein können durch Halogen,  $-NH_2$ ,  $-OH$ ,  $-CO_2R$ ,  $-NO_2$ ,  $-N_3$ ,  $-CN$ , Alkyl,  $C_1$ - $C_{20}$ -Acyl,  $C_1$ - $C_{20}$ -Acyloxy-Gruppen, in Frage.

10

Die Alkylgruppen in  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^7$  und  $R^8$  können im Ring bis 14 C-Atome, bevorzugt 6 bis 10, enthalten, und in der Alkylkette 1 bis 6, bevorzugt 1 bis 4 Atome. Bevorzugte Alkylreste sind z.B. Benzyl, Phenylethyl, Naphtylmethyl, Naphtylethyl,  $-(Pyridyl, Thienyl- oder Furyl)_n$ , wobei  $n = 1$  bis 4 bedeutet. Die Ringe können mehrfach

15

substituiert sein durch Halogen,  $-NO_2$ ,  $-N_3$ ,  $-CN$ , Alkyl,  $C_1$ - $C_{20}$ -Acyl,  $C_1$ - $C_{20}$ -Acyloxy-Gruppen.


Wenn der Rest  $R^3 = CH_2OR$  ist, dann muß auch der Rest  $R^4 = OR$  sein.

- 20 Die beliebige Schutzgruppe  $R^9$  und  $R^{11}$  kann zum Beispiel ein Ether oder Acylrest oder auch eine beliebige cyclische Schutzgruppe wie z.B. ein Acetonid sein. Als Ether- und Acylreste kommen die dem Fachmann bekannten Reste in Betracht. Bevorzugt sind leicht abspaltbare Etherreste, wie beispielsweise der Methoxymethyl-, Tetrahydropyranyl-, Tetrahydrofuranyl-, Trimethylsilyl-, tert.-Butyldimethylsilyl-, tert.-Butyldiphenylsilyl-,
- 25 Tribenzylsilylrest. Als Acylreste kommen z.B. Acetyl, Propionyl, Butyryl, Benzoyl, durch z.B. mit Amino- und/oder Hydroxygruppen substituiertes Alkanoyl in Frage.

Acetonide können aus dem Diol der Formel (IX) können mit beliebigen Ketoverbindungen, Aldehyden oder Ketonen, wie z. B., Acetaldehyd, Benzaldehyd Aceton, Cyclohexanon gebildet werden.

30

Aus Anspruch 1 soll die bereits bekannte Verbindung



(II)

- 35 von Schinzer et al. ausgeschlossen werden.

Eine geeignete Abgangsgruppe Z kann ein Halogenatom X, p-Toluolsulfonat oder -OSO<sub>2</sub>B wobei B für C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Perfluoralkyl steht, sein.

- 5 Das Halogenatom kann Fluor, Chlor, Brom, Iod sein, wobei Chlor, Brom und Iod bevorzugt sind.

Unter C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Perfluoralkyl sind geradkettige oder verzweigte vollständig fluoriierte Alkylreste wie zum Beispiel CF<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>F<sub>5</sub>, C<sub>3</sub>F<sub>7</sub>, C<sub>4</sub>F<sub>9</sub> zu verstehen.

10

Als Epothilonderivate sind alle offenkettigen und cyclischen, makroliden oder auch nicht makroliden, zusätzlich substituierten oder nicht substituierten Strukturen zu verstehen, die sich von Epothilon ableiten lassen.

- 15 Die Verbindungen aus den Ansprüchen 2 und 3 sind als Zwischenstufen des erfindungsgemäßen Verfahrens ebenfalls Gegenstände der vorliegenden Erfindung.  
Die nachfolgenden Beispiele dienen der näheren Erläuterung der Erfindungsgegenstandes, ohne ihn auf diese beschränken zu wollen.

20 **Beispiel 1**

**(3S)-1-Oxa-2-oxo-3-(tetrahydropyran-2(RS)-yloxy)-4,4-dimethyl-cyclopentan**

- Die Lösung von 74,1 g (569 mmol) D-(-)-Pantolacton in 1l wasserfreiem Dichlormethan versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon mit 102 ml 3,4-Dihydro-2H-pyran, 2 g p-Toluolsulfonsäure-Pyridiniumsalz und rührt 16 Stunden bei 23°C. Man gießt  
25 in eine gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung, trennt die organische Phase ab und trocknet über Natriumsulfat. Nach Filtration und Lösungsmittelabzug chromatographiert man den Rückstand an ca. 5 kg feinem Kieselgel mit einem Gemisch aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 119,6 g (558 mmol, 98%) der Titelverbindung als farbloses  
30 Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 1,13 (3H), 1,22 (3H), 1,46-1,91 (6H), 3,50-3,61 (1H), 3,86 (1H), 3,92 (1H), 4,01 (1H), 4,16 (1H), 5,16 (1H) ppm.

**Beispiel 2****(2RS,3S)-1-Oxa-2-hydroxy-3-(tetrahydropyran-2(RS)-yloxy)-4,4-dimethyl-cyclopentan**

- 5 Die Lösung von 117,5 g (548 mmol) der nach Beispiel 1 dargestellten Verbindung in 2,4 l wasserfreiem Toluol kühlt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon auf -70°C, versetzt innerhalb 1 Stunde mit 540 ml einer 1,2 molaren Lösung von Diisobutylaluminiumhydrid in Toluol und rührt noch 3 Stunden bei -70°C. Man läßt auf -20°C erwärmen, versetzt mit gesättigter Ammoniumchloridlösung, Wasser und trennt die  
 10 ausgefallenen Aluminiumsalze durch Filtration über Celite ab. Das Filtrat wird mit Wasser und gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Isoliert werden nach Filtration und Lösungsmittelabzug 111,4 g (515 mmol, 94%) der Titelverbindung als farbloses Öl, das man ohne Reinigung weiter umsetzt.  
 IR (CHCl<sub>3</sub>): 3480, 3013, 2950, 2874, 1262, 1133, 1074, 1026 und 808 cm<sup>-1</sup>.

15

**Beispiel 3****(3S)-2,2-Dimethyl-3-(tetrahydropyran-2(R)-yloxy)-pent-4-en-1-ol und (3S)-2,2-Dimethyl-3-(tetrahydropyran-2(S)-yloxy)-pent-4-en-1-ol**

- 20 Die Aufschlammung von 295 g Methyl-triphenylphosphoniumbromid in 2,5 l wasserfreiem Tetrahydrofuran versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon bei -60°C mit 313 ml einer 2,4 molaren Lösung von n-Butyllithium in n-Hexan, läßt auf 23°C erwärmen, eine Stunde nachrühren und kühlt auf 0°C. Man versetzt mit der Lösung von 66,2 g (306 mmol) der nach Beispiel 2 dargestellten Verbindung in 250 ml  
 25 Tetrahydrofuran, läßt auf 23°C erwärmen und 18 Stunden rühren. Man gießt in eine gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung, extrahiert mehrfach mit Dichlormethan und trocknet die vereinigten organischen Extrakte über Natriumsulfat. Nach Filtration und Lösungsmittelabzug chromatographiert man den Rückstand an ca. 5 l feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 36,5 g (170  
 30 mmol, 56%) des unpolaren, 14,4 g (67,3 mmol, 22%) des polaren THP-Isomeren der Titelverbindung, sowie 7,2 g (33,3 mmol; 11%) des Ausgangsmaterials jeweils als farbloses Öl.

- <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>), unpolares Isomer: δ = 0,78 (3H), 0,92 (3H), 1,41-1,58 (4H), 1,63-1,87 (2H), 3,18 (1H), 3,41 (1H), 3,48 (1H), 3,68 (1H), 3,94 (1H), 4,00 (1H), 4,43 (1H),  
 35 5,19 (1H), 5,27 (1H), 5,75 (1H) ppm.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>), polares Isomer: δ = 0,83 (3H), 0,93 (3H), 1,42-1,87 (6H), 2,76 (1H), 3,30 (1H), 3,45 (1H), 3,58 (1H), 3,83 (1H), 3,89 (1H), 4,65 (1H), 5,12-5,27 (2H), 5,92 (1H) ppm.

**Beispiel 4****(3S)-1-(tert.-Butyldiphenylsilyloxy)-2,2-dimethyl-pentan-3-(tetrahydropyran-2-yloxy)-pent-4-en**

Die Lösung von 59,3 g (277 mmol) des nach Beispiel 3 dargestellten THP-Isomeren in 1000 ml wasserfreiem Dimethylformamid versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon mit 28 g Imidazol, 85 ml tert.-Butyldiphenylchlorsilan und rührt 16 Stunden bei 23°C. Man gießt in Wasser, extrahiert mehrfach mit Dichlormethan, wäscht die vereinigten organischen Extrakte mit Wasser und trocknet über Natriumsulfat. Nach Filtration und Lösungsmittelabzug chromatographiert man den Rückstand an feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 106,7 g (236 mmol, 85%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,89 (3H), 0,99 (3H), 1,08 (9H), 1,34-1,82 (6H), 3,40 (1H), 3,51 (2H), 3,76 (1H), 4,02 (1H), 4,67 (1H), 5,18 (1H), 5,23 (1H), 5,68 (1H), 7,30-7,48 (6H), 7,60-7,73 (4H) ppm.

**Beispiel 5****(3S)-1-(tert.-Butyldiphenylsilyloxy)-2,2-dimethyl-3-hydroxy-pent-4-en**

Die Lösung von 106,7 g (236 mmol) der nach Beispiel 4 dargestellten Verbindung in 1,5 l wasserfreiem Ethanol versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon mit 5,9 g Pyridinium-p-Toluolsulfonat und erhitzt 6 Stunden auf 50°C. Nach Lösungsmittelabzug chromatographiert man den Rückstand an feinem Kieselgel mit einem Gemisch aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 82,6 g (224 mmol, 95%) der Titelverbindung als farbloses Öl, in dem noch zusätzlich ca. 5g Ethoxy-tetrahydropyran enthalten sind.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) einer analytischen Probe: δ = 0,89 (6H), 1,08 (9H), 3,45 (1H), 3,49 (1H), 3,58 (1H), 4,09 (1H), 5,21 (1H), 5,33 (1H), 5,93 (1H), 7,34-7,51 (6H), 7,63-7,73 (4H) ppm.

**Beispiel 6****(3S)-1-(tert.-Butyldiphenylsilyloxy)-2,2-dimethyl-pentan-3,5-diol**

Die Lösung von 570 mg (1,55 mmol) der nach Beispiel 5 dargestellten Verbindung setzt man in Analogie zu Beispiel 22 um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 410 mg (1,06 mmol, 68%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,82 (3H), 0,93 (3H), 1,08 (9H), 1,56-1,79 (2H), 3,11 (1H), 3,50 (2H), 3,78-3,92 (3H), 4,02 (1H), 7,34-7,51 (6H), 7,61-7,71 (4H) ppm.

**Beispiel 7****4(S)-[2-Methyl-1-(tert.-butyldiphenylsilyloxy)-prop-2-yl]-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan**

- 5 Die Lösung von 5,60 g (14,5 mmol) der nach Beispiel 6 dargestellten Verbindung in 250 ml wasserfreiem Dichlormethan versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon mit 10 ml 2,2-Dimethoxypropan, 145 mg Campher-10-sulfonsäure und rührt 6 Stunden bei 23°C. Man versetzt mit Triethylamin, verdünnt mit Ethylacetat, wäscht mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung und trocknet über Natriumsulfat. Nach  
10 Filtration und Lösungsmittelabzug chromatographiert man den Rückstand an feinem Kieselgel mit einem Gemisch aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 5,52 g (12,9 mmol, 89%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,83 (3H), 0,89 (3H), 1,07 (9H), 1,30 (1H), 1,36 (3H), 1,44 (3H), 1,71 (1H), 3,24 (1H), 3,62 (1H), 3,86 (1H), 3,91-4,03 (2H), 7,31-7,48 (6H), 7,61-  
15 7,74 (4H) ppm.

**Beispiel 8****(4S)-4-(2-Methyl-1-hydroxy-prop-2-yl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan**

- 20 Die Lösung von 5,6 g (13,1 mmol) der nach Beispiel 7 dargestellten Verbindung in 75 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon mit 39 ml einer 1 molaren Lösung von Tetrabutylammoniumfluorid in Tetrahydrofuran und erwärmt 16 Stunden auf 50°C. Man versetzt mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung, extrahiert mehrfach mit Ethylacetat, wäscht mit  
25 gesättigter Natriumchloridlösung und trocknet über Natriumsulfat. Den nach Filtration und Lösungsmittelabzug erhaltenen Rückstand reinigt man durch Chromatographie an feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 2,43 g (12,9 mmol, 99%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,87 (3H), 0,90 (3H), 1,35 (1H), 1,37 (3H), 1,43 (3H), 1,77  
30 (1H), 2,93 (1H), 3,36 (1H), 3,53 (1H), 3,79 (1H), 3,87 (1H), 3,96 (1H) ppm.

**Beispiel 9****(4S)-4-(2-Methyl-1-oxo-prop-2-yl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan**

- 35 Die Lösung von 0,13 ml Oxalylchlorid in 5,7 ml wasserfreiem Dichlormethan kühlt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon auf -70°C, versetzt mit 0,21 ml Dimethylsulfoxid, der Lösung von 200 mg (1,06 mmol) der nach Beispiel 8 dargestellten Verbindung in 5,7 ml wasserfreiem Dichlormethan und rührt 0,5 Stunden. Anschließend

versetzt man mit 0,65 ml Triethylamin, läßt 1 Stunde bei -30°C reagieren und versetzt mit n-Hexan und gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung. Die organische Phase wird abgetrennt, die wässrige noch mehrfach mit n-Hexan extrahiert, die vereinigten organischen Extrakte mit Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Den nach Filtration und Lösungsmittelabzug erhaltenen Rückstand setzt man ohne Reinigung  
5 weiter um.

### Beispiel 10

#### 10 (4S)-4-(2-Methyl-3(RS)-hydroxy-pent-2-yl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan

Die Lösung von 900 mg (4,83 mmol) der nach Beispiel 9 dargestellten Verbindung in 14 ml wasserfreiem Diethylether versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon bei 0°C mit 2,42 ml einer 2,4 molaren Lösung von Ethylmagnesiumbromid in Diethylether, läßt auf 23°C erwärmen und 16 Stunden rühren. Man versetzt mit  
15 gesättigter Ammoniumchloridlösung, trennt die organische Phase ab und trocknet über Natriumsulfat. Den nach Filtration und Lösungsmittelabzug erhaltenen Rückstand reinigt man durch Chromatographie an feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 321 mg (1,48 mmol, 31%) des unpolaren 3R- oder 3S- Epimeren der Titelverbindung, 542 mg (2,51 mmol, 52%) des polaren 3S- oder  
20 3R- Epimeren der Titelverbindung sowie 77 mg der in Beispiel 1c beschriebenen Titelverbindung jeweils als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) unpolares Isomer: δ = 0,86 (3H), 0,89 (3H), 1,03 (3H), 1,25-1,37 (2H), 1,37 (3H), 1,46 (3H), 1,49 (1H), 1,84 (1H), 3,35 (1H), 3,55 (1H), 3,81-4,02 (3H) ppm.

25 <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) polares Isomer: δ = 0,72 (3H), 0,91 (3H), 0,99 (3H), 1,25-1,44 (2H), 1,38 (3H), 1,43-1,60 (1H), 1,49 (3H), 1,76 (1H), 3,39 (1H), 3,63 (1H), 3,79-4,03 (3H) ppm.

### Beispiel 11

30

#### (4S)-4-(2-Methyl-3-oxo-pent-2-yl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan

Die Lösung von 850 mg (3,93 mmol) eines Gemisches der nach Beispiel 10 dargestellten Verbindungen in 63 ml wasserfreiem Dichlormethan versetzt man mit Molekularsieb (4A, ca. 80 Kugeln), 690 mg N-Methylmorpholino-N-oxid, 70 mg  
35 Tetrapropylammoniumperruthenat und rührt 16 Stunden bei 23°C unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon. Man engt ein und reinigt das erhaltene Rohprodukt durch Chromatographie an ca. 200 ml feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus

n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 728 mg (3,39 mmol, 86%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  = 1,00 (3H), 1,07 (3H), 1,11 (3H), 1,31 (1H), 1,32 (3H), 1,41 (3H), 1,62 (1H), 2,52 (2H), 3,86 (1H), 3,97 (1H), 4,05 (1H) ppm.

5

### Beispiel 12

#### (4S)-4-(3-Methyl-2-oxo-prop-3-yl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan

10 In Analogie zu Beispiel 11 werden 420 mg (2,08 mmol) der nach Beispiel 12a dargestellten Verbindungen umgesetzt. Nach Aufarbeitung und Reinigung isoliert man 388 mg (1,94 mmol, 93%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  = 1,08 (3H), 1,12 (3H), 1,33 (3H), 1,35 (1H), 1,42 (3H), 1,63 (1H), 2,17 (3H), 3,87 (1H), 3,98 (1H), 4,04 (1H) ppm.

### 15 Beispiel 12a

#### (4S)-4-((2RS)-3-Methyl-2-hydroxy-prop-3-yl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan

20 In Analogie zu Beispiel 10 werden 450 mg (2,42 mmol) der nach Beispiel 9 dargestellten Verbindung unter Verwendung von Methylmagnesiumbromid umgesetzt. Nach Aufarbeitung und Reinigung isoliert man 431 mg (2,13 mmol, 88%) eines chromatographisch trennbaren Gemisches der epimeren Titelverbindungen als farbloses Öl.

### 25 Beispiel 13

#### (4S)-4-(2-Methyl-3-oxo-hex-2-yl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan

30 In Analogie zu Beispiel 11 werden 230 mg (1,00 mmol) der nach Beispiel 13a dargestellten Verbindungen umgesetzt. Nach Aufarbeitung und Reinigung isoliert man 185 mg (0,81 mmol, 81%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  = 0,88 (3H), 1,04 (3H), 1,12 (3H), 1,22-1,37 (1H), 1,31 (3H), 1,40 (3H), 1,48-1,71 (3H), 2,46 (2H), 3,83 (1H), 3,96 (1H), 4,04 (1H) ppm.



**Beispiel 13a****(4S)-4-((3RS)-2-Methyl-3-hydroxy-hex-2-yl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 10 werden 450 mg (2,42 mmol) der nach Beispiel 9 dargestellten  
5 Verbindung unter Verwendung von n-Propylmagnesiumbromid umgesetzt. Nach  
Aufarbeitung und Reinigung isoliert man insgesamt 244 mg (1,06 mmol, 44%) eines  
trennbaren Gemisches der epimeren Titelverbindungen sowie 191 mg der in Beispiel 1c  
beschriebenen Titelverbindung jeweils als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) unpolares Isomer:  $\delta$  = 0,87 (3H), 0,89 (3H), 0,94 (3H), 1,25-1,52  
10 (4H), 1,38 (3H), 1,45 (3H), 1,66 (1H), 1,85 (1H), 3,46 (1H), 3,80-4,02 (4H) ppm.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) polares Isomer:  $\delta$  = 0,73 (3H), 0,92 (3H), 0,95 (3H), 1,19-1,84 (6H),  
1,37 (3H), 1,49 (3H), 3,49 (1H), 3,60 (1H), 3,80-4,03 (3H) ppm.

**Beispiel 14**

15

**(4R)-4-(2-Methyl-3-oxo-pent-2-yl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan**

Ausgehend von L-(+)-Pantolacton wird in Analogie zu den in den Beispielen 1 bis 11  
beschriebenen Verfahren über die jeweils enantiomeren Zwischenstufen die  
Titelverbindung hergestellt.

20 <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  = 1,00 (3H), 1,07 (3H), 1,12 (3H), 1,24-1,37 (1H), 1,31 (3H),  
1,40 (3H), 1,61 (1H), 2,50 (2H), 3,84 (1H), 3,95 (1H), 4,03 (1H) ppm.

**Beispiel 15****25 (4R)-4-(3-Methyl-2-oxo-prop-3-yl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan**

Ausgehend von L-(+)-Pantolacton wird in Analogie zu den in den Beispielen 12, 12a und  
1 bis 9 beschriebenen Verfahren über die jeweils enantiomeren Zwischenstufen die  
Titelverbindung hergestellt.

30 <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  = 1,07 (3H), 1,12 (3H), 1,30-1,39 (1H), 1,33 (3H), 1,43 (3H),  
1,62 (1H), 2,17 (3H), 3,86 (1H), 3,96 (1H), 4,03 (1H) ppm.

**Beispiel 16****(4R)-4-(2-Methyl-3-oxo-hex-2-yl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan**

Ausgehend von L-(+)-Pantolacton wird in Analogie zu den in den Beispielen 13, 13a und  
 5 1 bis 9 beschriebenen Verfahren über die jeweils enantiomeren Zwischenstufen die  
 Titelverbindung hergestellt.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,88 (3H), 1,04 (3H), 1,12 (3H), 1,22-1,37 (1H), 1,31 (3H),  
 1,41 (3H), 1,48-1,72 (3H), 2,47 (2H), 3,84 (1H), 3,96 (1H), 4,05 (1H) ppm.

**10 Beispiel 17****(S)-2,2-Dimethyl-4-[1-[[[dimethyl(1,1-dimethylethyl)silyl]oxy]methyl]cyclobutyl]-1,3-dioxan**

370 mg (1,35 mmol) der nach Beispiel 17a dargestellten Verbindung werden in 10 ml  
 15 Aceton gelöst. Man addiert eine Spatelspitze p-Toluolsulfonsäure und läßt 2 Stunden bei  
 25°C nachrühren. Anschließend wird das Reaktionsgemisch auf gesättigte  
 Natriumhydrogencarbonatlösung gegossen. Man extrahiert mit Ethylacetat, wäscht die  
 organische Phase mit gesättigter Natriumchloridlösung, trocknet über Natriumsulfat und  
 engt im Vakuum ein. Nach Säulenchromatographie an Kieselgel mit einem Gemisch aus  
 20 Hexan/Ethylacetat werden 338 mg (1,07 mmol, 79%) der Titelverbindung erhalten.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,03 (6H), 0,88 (9H), 1,38 (3H), 1,42 (3H), 1,50-1,80 (4H),  
 2,00 (1H), 3,52 (1H), 3,62 (1H), 3,85-4,00 (3H) ppm.

**Beispiel 17a**

25

**(S)-1-[1-[[[Dimethyl(1,1-dimethylethyl)silyl]oxy]methyl]cyclobutyl]-1,3-propandiol**

Zu einer Lösung von 1 g (2,24 mmol) der nach Beispiel 17b dargestellten Verbindung A  
 in 10 ml absolutem Toluol werden bei 0°C 4 ml einer 1,2 molaren Lösung von  
 Diisobutylaluminiumhydrid in Toluol getropft. Man läßt 1,5 Stunden bei 0°C nachrühren  
 30 und addiert dann 5 ml Wasser. Es wird über Celite filtriert. Das Filtrat wird über  
 Natriumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Man erhält nach  
 Säulenchromatographie des Rohprodukts an Kieselgel mit einem Gemisch aus  
 Hexan/Ethylacetat 370 mg (1,35 mmol, 60%) der Titelverbindung.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,05 (6H), 0,90 (9H), 1,55-1,60 (2H), 1,80 (2H), 1,90 (3H),  
 35 2,10 (1H), 3,75 (1H), 3,85-3,95 (4H) ppm.

**Beispiel 17b**

**[1R-[1a(R\*),2b]]-2-Phenylcyclohexyl 3-[1-[[[dimethyl(1,1-dimethylethyl)silyl]oxy]methyl]cyclobutyl]-3-hydroxypropanoat (A) und**  
**[1R-[1a(S\*),2b]]-2-Phenylcyclohexyl 3-[1-[[[dimethyl(1,1-dimethylethyl)silyl]oxy]methyl]cyclobutyl]-3-hydroxypropanoat (B)**

Aus 7,2 ml Diisopropylamin und Butyllithium (32 ml einer 1,6 molaren Lösung in Hexan) wird in absolutem Tetrahydrofuran Lithiumdiisopropylamid hergestellt. Dann addiert man bei -78°C eine Lösung von 11,2 g (1R-trans)-2-Phenylcyclohexyl acetat in 100 ml absolutem Tetrahydrofuran und läßt 30 Minuten bei dieser Temperatur nachrühren. Anschließend wird eine Lösung von 7,7 g (33,7 mmol) der nach Beispiel 17c dargestellten Verbindung in 50 ml Tetrahydrofuran addiert. Man läßt 1,5 Stunden bei -78°C nachrühren und gießt danach das Reaktionsgemisch auf gesättigte wäßrige Ammoniumchloridlösung. Man extrahiert mit Ethylacetat, wäscht die organische Phase mit gesättigter Natriumchloridlösung, trocknet über Natriumsulfat und engt im Vakuum ein. Nach Säulenchromatographie des Rohprodukts an Kieselgel mit einem Gemisch aus Hexan/Ethylacetat erhält man 6,34 g (14,2 mmol, 42%) der Titelverbindung A und 4,22 g (9,4 mmol, 28%) der Titelverbindung B.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) von A: δ = 0,04 (6H), 0,98 (9H), 2,69 (1H), 3,08 (1H), 3,60 (1H), 3,67 (1H), 3,78-3,84 (1H), 4,97 (1H), 7,15-7,30 (5H) ppm.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) von B: δ = 0,03 (6H) 0,90 (9H), 2,68 (1H), 2,80 (1H), 3,56 (2H), 3,68-3,72 (1H), 4,99 (1H), 7,18-7,30 m (5H) ppm.

**Beispiel 17c**

**1-[[[Dimethyl(1,1-dimethylethyl)silyl]oxy]methyl]cyclobutancarbaldehyd**

8 ml Oxalylchlorid werden in 100 ml Dichlormethan gelöst. Man kühlt auf -78°C und addiert 13 ml Dimethylsulfoxid. Man läßt 3 Minuten nachrühren und addiert dann eine Lösung von 13,5 g (58,6 mmol) der nach Beispiel 17d dargestellten Verbindung in 80 ml Dichlormethan. Nach weiteren 15 Minuten Nachrührzeit werden 58 ml Triethylamin hinzugetropft. Anschließend läßt man auf 0°C erwärmen. Dann wird das Reaktionsgemisch auf gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung gegossen. Man extrahiert mit Dichlormethan, wäscht die organische Phase mit gesättigter Natriumchloridlösung, trocknet über Natriumsulfat und engt im Vakuum ein. Nach Chromatographie des Rohprodukts an Kieselgel mit einem Gemisch aus Hexan/Ethylacetat erhält man 7,7 g (33,7 mmol, 58%) der Titelverbindung.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 9,70 s (1H), 3,83 s (2H), 2,20-2,30 m (2H), 1,85-2,00 m (4H), 0,90 s (9H), 0,03 s (6H) ppm.

**Beispiel 17d****1-[[[Dimethyl(1,1-dimethylethyl)silyl]oxy]methyl]cyclobutanmethanol**

- 5 Zu einer Suspension von 3,4 g Natriumhydrid (60%ig in Öl) in 35 ml absolutem Tetrahydrofuran wird bei 0°C eine Lösung von 9,9 g (85 mmol) der nach Beispiel 17e dargestellten Verbindung in 100 ml absolutem Tetrahydrofuran gegeben. Man läßt 30 Minuten nachrühren und addiert dann eine Lösung von 12,8 g *tert.* Butyldimethylsilylchlorid in 50 ml Tetrahydrofuran. Man läßt eine Stunde bei 25°C
- 10 nachrühren und gießt dann das Reaktionsgemisch auf gesättigte wäßrige Natriumhydrogencarbonatlösung. Es wird mit Ethylacetat extrahiert. Die organische Phase wird mit gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen und über Natriumsulfat getrocknet. Nach Abziehen des Lösungsmittels im Vakuum wird das erhaltene Rohprodukt durch Säulenchromatographie an Kieselgel mit einem Gemisch aus
- 15 Hexan/Ethylacetat gereinigt. Man erhält 13,5 g (58,6 mmol, 69%) der Titelverbindung.  
<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,04 (6H), 0,90 (9H), 1,70-2,00 (6H), 3,70 (4H) ppm.

**Beispiel 17e**

20

**1,1-Cyclobutandimethanol**

- Zu einer Lösung von 20 g (99,9 mmol) 1,1-Cyclobutandicarbonsäurediethylester in 200 ml absolutem Tetrahydrofuran werden bei 0°C 170 ml einer 1,2 molaren Lösung von Diisobutylaluminiumhydrid getropft. Man läßt eine Stunde bei 0°C nachrühren und
- 25 addiert dann 30 ml Wasser. Es wird über Celite filtriert. Das Filtrat wird mit Natriumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Das erhaltene Rohprodukt (9,9 g, 85,2 mmol, 85%) wird ohne Aufreinigung in die Folgestufe eingesetzt.

**Beispiel 18**

30

**(R)-2,2-Dimethyl-4-[1-[[[dimethyl(1,1-dimethylethyl)silyl]oxy]methyl]cyclobutyl]-1,3-dioxan**

- In Analogie zu Beispiel 17 setzt man 250 mg (0,91 mmol) der nach Beispiel 18a hergestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 228 mg (0,72
- 35 mmol, 60%) der Titelverbindung.  
Das <sup>1</sup>H-NMR-Spektrum ist deckungsgleich mit dem in Beispiel 12 beschriebenen.

**Beispiel 18a****(R)-1-[1-[[[Dimethyl(1,1-dimethylethyl)silyl]oxy]methyl]cyclobutyl]-1,3-propandiol**

In Analogie zu Beispiel 17a setzt man 700 mg (1,57 mmol) der nach Beispiel 17b  
5 hergestellten Verbindung B um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 250 mg  
(0,91 mmol, 58%) der Titelverbindung.

Das <sup>1</sup>H-NMR-Spektrum ist deckungsgleich mit dem in Beispiel 17a beschriebenen.

10 **Beispiel 19****2,2-Dimethyl-4-[1-[[[dimethyl(1,1-dimethylethyl)silyl]oxy]methyl]cyclobutyl]-1,3-dioxan**

In Analogie zu Beispiel 17 setzt man 190 mg (0,69 mmol) der nach Beispiel 19a  
15 hergestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 171 mg (0,54  
mmol, 79%) der Titelverbindung.

Das <sup>1</sup>H-NMR-Spektrum ist deckungsgleich mit dem in Beispiel 17 beschriebenen.

**Beispiel 19a**

20

**1-[1-[[[Dimethyl(1,1-dimethylethyl)silyl]oxy]methyl]cyclobutyl]-1,3-propandiol**

In Analogie zu Beispiel 17a setzt man 500 mg (1,12 mmol) eines Gemisches der nach  
Beispiel 17b hergestellten Verbindungen A und B um und isoliert nach Aufarbeitung und  
Reinigung 190 mg (0,69 mmol, 62%) der Titelverbindung.

25 Das <sup>1</sup>H-NMR-Spektrum ist deckungsgleich mit dem in Beispiel 17a beschriebenen.

**Beispiel 20****(4R,5S,6S)-2-((4S)-2,2-Dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)-2,4,6-trimethyl-3-oxo-5-hydroxy-  
30 9-tert.-butyldiphenylsilyloxy-decan**

Die Lösung von 1,07 ml Diisopropylamin in 25 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran kühlt  
man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon auf -30°C, versetzt mit 3,18 ml einer  
2,4 molaren Lösung von n-Butyllithium in n-Hexan und rührt noch 15 Minuten. Bei -  
78°C tropft man die Lösung von 1,63g (7,61 mmol) der nach Beispiel 11 dargestellten  
35 Verbindung in 25 ml Tetrahydrofuran zu und läßt 1 Stunde reagieren. Anschließend  
versetzt man mit der Lösung von 2,04 g (8,35 mmol) der nach Beispiel 21 dargestellten  
Verbindung in Tetrahydrofuran und gießt nach 45 Minuten in gesättigte  
Ammoniumchloridlösung. Man verdünnt mit Wasser, extrahiert mehrfach mit Ethylacetat,

wäscht die vereinigten organischen Extrakte mit gesättigter Natriumchloridlösung, trocknet über Natriumsulfat und engt im Vakuum ein. Nach Säulenchromatographie an Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-Hexan und Ethylacetat werden neben 37% Ausgangsmaterial 1,72 g (3,75 mmol, 49%) der Titelverbindung sowie 271 mg (0,59 mmol, 8%) eines Diastereomeren erhalten.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  = 0,04 (6H), 0,83 (3H), 0,89 (9H), 1,02 (3H), 1,09 (3H), 1,04-1,17 (1H), 1,21 (3H), 1,33 (3H), 1,32-1,40 (1H), 1,40 (3H), 1,40-1,58 (5H), 1,63 (1H), 1,78 (1H), 3,28 (1H), 3,37 (1H), 3,50 (1H), 3,61 (2H), 3,86 (1H), 3,97 (1H), 4,05 (1H) ppm.

### Beispiel 21

#### (2S)-2-methyl-6-tert.butyldimethylsilyloxy-hexanal

In Analogie zu Beispiel 1b setzt man 2,07 g (8,39 mmol) (2S)-2-methyl-6-tert.butyldimethylsilyloxy-hexanol um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 2,04 g (8,34 mmol, 99%) der Titelverbindung als farbloses Öl

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  = 0,04 (6H), 0,90 (9H), 1,10 (3H), 1,32-1,48 (3H), 1,48-1,60 (2H), 1,72 (1H), 2,34 (1H), 3,61 (2H), 9,62 (1H) ppm.

### Beispiel 22

#### (3S)-1-(tert.-Butyldiphenylsilyloxy)-2,2-dimethyl-3-(tetrahydropyran-2-yloxy)-pentan-5-ol

Die Lösung von 3,09 g (6,83 mmol) der nach Beispiel 4 dargestellten Verbindung in 82 ml Tetrahydrofuran versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon bei 23°C mit 13,1 ml einer 1 molaren Lösung von Boran in Tetrahydrofuran und läßt 1 Stunde reagieren. Anschließend versetzt man unter Eiskühlung mit 16,4 ml einer 5%-igen Natronlauge sowie 8,2 ml einer 30%-igen Wasserstoffperoxidlösung und rührt weitere 30 Minuten. Man gießt in Wasser, extrahiert mehrfach mit Ethylacetat, wäscht die vereinigten organischen Extrakte mit Wasser, gesättigter Natriumchloridlösung und trocknet über Magnesiumsulfat. Den nach Filtration und Lösungsmittelabzug erhaltenen Rückstand reinigt man durch Chromatographie an feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 1,78 g (3,78 mmol, 55%) der Titelverbindung als chromatographisch trennbares Gemisch der beiden THP-Epimeren sowie 0,44g (1,14 mmol, 17%) der Titelverbindung aus Beispiel 1e jeweils als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>), unpolares THP-Isomer:  $\delta$  = 0,80 (3H), 0,88 (3H), 1,10 (9H), 1,18-1,80 (9H), 3,27 (1H), 3,39 (1H), 3,48 (1H), 3,64 (1H), 3,83 (1H), 3,90-4,08 (2H), 4,49 (1H), 7,31-7,50 (6H), 7,58-7,73 (4H) ppm.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>), polares THP-Isomer:  $\delta$  = 0,89 (3H), 0,98 (3H), 1,08 (9H), 1,36-1,60 (4H), 1,62-1,79 (3H), 1,88 (1H), 2,03 (1H), 3,37 (1H), 3,50 (1H), 3,57 (1H), 3,62-3,83 (4H), 4,70 (1H), 7,30-7,48 (6H), 7,61-7,73 (4H) ppm.

### Beispiel 23

#### 10 4(S)-[2-Methyl-1-(tert.-butyldiphenylsilyloxy)-prop-2-yl]-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan

Die Lösung von 100 mg (0,212 mmol) der nach Beispiel 22 dargestellten Verbindungen in 2,6 ml wasserfreiem Aceton versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon mit 78,9 mg Kupfer(II)sulfat, einer Spatelspitze p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat und rührt 16 Stunden bei 23°C. Man versetzt mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung, extrahiert mehrfach mit Diethylether, wäscht mit gesättigter Natriumchloridlösung und trocknet über Natriumsulfat. Den nach Filtration und Lösungsmittelabzug erhaltenen Rückstand reinigt man durch Chromatographie an feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 24 mg (56  $\mu$ mol, 27%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

20 <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  = 0,83 (3H), 0,89 (3H), 1,07 (9H), 1,30 (1H), 1,36 (3H), 1,44 (3H), 1,71 (1H), 3,24 (1H), 3,62 (1H), 3,86 (1H), 3,91-4,03 (2H), 7,31-7,48 (6H), 7,61-7,74 (4H) ppm.

### Beispiel 24

25

#### (2S,4S)-2-(2-Cyanophenyl)-4-(2-methyl-3-oxo-pent-2-yl)-[1,3]dioxan

In Analogie zu Beispiel 11 setzt man 463 mg (1,60 mmol) der nach Beispiel 24a dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 420 mg (1,46 mmol, 91%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

30 <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  = 1,00 (3H), 1,19 (3H), 1,24 (3H), 1,49 (1H), 1,92 (1H), 2,56 (2H), 4,03 (1H), 4,16 (1H), 4,32 (1H), 5,78 (1H), 7,44 (1H), 7,60 (1H), 7,64-7,72 (2H) ppm.

**Beispiel 24a****(2S,4S)-2-(2-Cyanophenyl)-4-((3RS)-2-methyl-3-hydroxy-pent-2-yl)-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 10 setzt man 780 mg (max. 2,18 mmol) des nach Beispiel 24b  
 5 dargestellten Rohproduktes um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 468 mg  
 (1,62 mmol, 74%) der epimeren Titelverbindungen als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,81-1,09 (9H), 1,22-1,43 (1H), 1,43-1,70 (2H), 2,04 (1H), 2,35  
 (0,55H), 2,89 (0,45H), 3,41-3,59 (1H), 3,89-4,13 (2H), 4,36 (1H), 5,78 (0,45H), 5,81  
 (0,55H), 7,45 (1H), 7,54-7,78 (3H) ppm.

10

**Beispiel 24b****(2S,4S)-2-(2-Cyanophenyl)-4-(2-methyl-1-oxo-prop-2-yl)-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 9 setzt man 570 mg (2,18 mmol) der nach Beispiel 24c  
 15 dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung 780 mg der Titelverbindung  
 als gelbes Öl, die man ohne Reinigung weiter umsetzt.

**Beispiel 24c****(2S,4S)-2-(2-Cyanophenyl)-4-(2-methyl-1-hydroxy-prop-2-yl)-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 8 setzt man 1,22 g (2,44 mmol) der nach Beispiel 24d  
 dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 593 mg (2,27  
 mmol, 93%) der Titelverbindung als farbloses Öl

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,89 (3H), 0,97 (3H), 1,51 (1H), 2,01 (1H), 2,42 (1H), 3,31  
 25 (1H), 3,72 (1H), 3,97 (1H), 4,02 (1H), 4,39 (1H), 5,78 (1H), 7,46 (1H), 7,63 (1H), 7,69  
 (1H), 7,75 (1H) ppm.

**Beispiel 24d****(2S,4S)-2-(2-Cyanophenyl)-4-[2-methyl-1-(tert.-butyldiphenylsilyloxy)-prop-2-yl]-[1,3]dioxan**

Die Lösung von 1,00 g (2,59 mmol) der nach Beispiel 6 dargestellten Verbindung in 50  
 ml Benzol versetzt man mit 850 mg 2-Cyanobenzaldehyd, einer Spatelspitze p-  
 Toluolsulfonsäure-Monohydrat und refluxiert 16 Stunden am Wasserabscheider unter  
 35 einer Atmosphäre aus trockenem Argon. Man versetzt mit 0,5 ml Triethylamin, verdünnt  
 mit Ethylacetat, wäscht mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung und trocknet  
 über Natriumsulfat. Nach Filtration und Lösungsmittelabzug chromatographiert man den



Rückstand an feinem Kieselgel mit einem Gemisch aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 1,22 g (2,44 mmol, 94%) der Titelverbindung als farbloses Öl

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,99 (6H), 1,05 (9H), 1,47 (1H), 1,98 (1H), 3,34 (1H), 3,63 (1H), 3,96-4,09 (2H), 4,31 (1H), 5,75 (1H), 7,17 (2H), 7,24-7,51 (5H), 7,51-7,74 (7H) ppm.

### Beispiel 25

#### (2S,4S)-4-(2-Methyl-3-oxo-pent-2-yl)-2-phenyl-[1,3]dioxan

In Analogie zu Beispiel 11 setzt man 435 mg (1,65 mmol) der nach Beispiel 25a dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 410 mg (1,56 mmol, 95%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 1,02 (3H), 1,17 (3H), 1,23 (3H), 1,44 (1H), 1,84 (1H), 2,58 (2H), 3,97 (1H), 4,06 (1H), 4,30 (1H), 5,50 (1H), 7,28-7,49 (5H) ppm.

### Beispiel 25a

#### (2S,4S)-4-((3RS)-2-Methyl-3-hydroxy-pent-2-yl)-2-phenyl-[1,3]dioxan

In Analogie zu Beispiel 10 setzt man 715 mg (max. 2,12 mmol) des nach Beispiel 25b dargestellten Rohproduktes um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 440 mg (1,66 mmol, 79%) der epimeren Titelverbindungen als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,80-1,10 (9H), 1,23-1,42 (1H), 1,42-1,70 (2H), 1,90-2,16 (1H), 2,92 (0,6 H), 3,07 (0,4H), 3,40-3,53 (1H), 3,86 (1H), 3,98 (1H), 4,32 (1H), 5,49 (0,4H), 5,55 (0,6H), 7,28-7,40 (3H), 7,40-7,51 (2H) ppm.

### Beispiel 25b

#### (2S,4S)-4-(2-Methyl-1-oxo-prop-2-yl)-2-phenyl-[1,3]dioxan

In Analogie zu Beispiel 9 setzt man 500 mg (2,12 mmol) der nach Beispiel 25c dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung 715 mg der Titelverbindung als gelbes Öl, die man ohne Reinigung weiter umsetzt.

**Beispiel 25c****(4S,2S)-4-(2-Methyl-1-hydroxy-prop-2-yl)-2-phenyl-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 8 setzt man 1,20 g (2,53 mmol) der nach Beispiel 25d  
 5 dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 518 mg (2,19  
 mmol, 87%) der Titelverbindung als farbloses Öl

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,98 (6H), 1,49 (1H), 2,00 (1H), 2,49 (1H), 3,46 (1H), 3,62  
 (1H), 3,81 (1H), 3,98 (1H), 4,33 (1H), 5,51 (1H), 7,30-7,41 (3H), 7,41-7,51 (2H) ppm.

**10 Beispiel 25d****(4S,2S)-4-[2-Methyl-1-(tert.-butyldiphenylsilyloxy)-prop-2-yl]-2-phenyl-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 24d setzt man 1,00 g (2,59 mmol) der nach Beispiel 6  
 15 dargestellten Verbindung in 50 ml Toluol unter Verwendung von Benzaldehyd um und  
 isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 1,2 g (2,53 mmol, 98%) der Titelverbindung als  
 farbloses Öl

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,93 (3H), 1,00 (3H), 1,07 (9H), 1,43 (1H), 1,92 (1H), 3,30  
 (1H), 3,72 (1H), 3,95 (1H), 4,00 (1H), 4,30 (1H), 5,53 (1H), 7,18 (2H), 7,29-7,49 (9H),  
 7,61 (2H), 7,67 (2H) ppm.

20

**Beispiel 26****(4S)-(2-Methyl-3-oxo-pent-2-yl)-2,2-pentamethylen-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 11 setzt man 386 mg (1,51 mmol) der nach Beispiel 26a  
 25 dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 376 mg (1,48  
 mmol, 98%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 1,01 (3H), 1,09 (3H), 1,17 (3H), 1,22-1,38 (3H), 1,40-1,72  
 (8H), 2,15 (1H), 2,57 (2H), 3,81 (1H), 3,92-4,07 (2H) ppm.

**30 Beispiel 26a****(4S)-4-(2-Methyl-3-hydroxy-pent-2-yl)-2,2-pentamethylen-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 10 setzt man 678 mg (max 1,97 mmol) des nach Beispiel 26b  
 35 dargestellten Rohproduktes um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 391 mg  
 (1,54 mmol, 77%) der epimeren Titelverbindungen als farbloses Öl.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 0,70-1,08 (9H), 1,23-1,98 (13H), 2,01-2,13 (1H), 3,37-3,50  
 (1H), 3,61 (0,5H), 3,80-4,06 (3,5H) ppm.

**Beispiel 26b****(4S)-4-(2-Methyl-1-oxo-prop-2-yl)-2,2-pentamethylen-[1,3]dioxan**

- 5 In Analogie zu Beispiel 9 setzt man 450 mg (1,97 mmol) der nach Beispiel 26c dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung 678 mg der Titelverbindung als gelbes Öl, die man ohne Reinigung weiter umsetzt.

**Beispiel 26c****(4S)-4-(2-Methyl-1-hydroxy-prop-2-yl)-2,2-pentamethylen-[1,3]dioxan**

- 10 In Analogie zu Beispiel 24c setzt man 1,09 g (2,34 mmol) der nach Beispiel 26d dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 470 mg (2,06 mmol, 88%) der Titelverbindung als farbloses Öl  
 $^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  = 0,88 (3H), 0,94 (3H), 1,24-1,71 (10H), 1,81 (1H), 2,18 (1H), 3,09 (1H), 3,39 (1H), 3,60 (1H), 3,80 (1H), 3,87 (1H), 4,02 (1H) ppm.

15

**Beispiel 26d****(4S)-4-[2-Methyl-1-(tert.-butyldiphenylsilyloxy)-prop-2-yl]-2,2-pentamethylen-[1,3]dioxan**

- 20 In Analogie zu Beispiel 24d setzt man 1,00 g (2,59 mmol) der nach Beispiel 6 dargestellten Verbindung in 50 ml Toluol unter Verwendung von Cyclohexanon um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 1,09 g (2,34 mmol, 90%) der Titelverbindung als farbloses Öl  
 $^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  = 0,84 (3H), 0,89 (3H), 0,97-1,10 (10H), 1,20-1,64 (9H), 1,71 (1H), 2,13 (1H), 3,33 (1H), 3,56 (1H), 3,81 (1H), 3,89 (1H), 3,99 (1H), 7,32-7,49 (6H), 7,60-7,74 (4H) ppm.
- 25

**Beispiel 27****(4S)-4-(2-Methyl-3-oxo-pent-2-yl)-2,2-tetramethylen-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 11 setzt man 348 mg (1,44 mmol) der nach Beispiel 27a  
5 dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 332 mg (1,38  
mmol, 96%) der Titelverbindung als farbloses Öl.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  = 1,00 (3H), 1,07 (3H), 1,17 (3H), 1,31 (1H), 1,50-2,00 (9H),  
2,52 (2H), 3,84 (1H), 3,88-3,99 (2H) ppm.

**10 Beispiel 27a****(4S)-4-(2-Methyl-3-hydroxy-pent-2-yl)-2,2-tetramethylen-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 10 setzt man 611 mg (max. 1,87 mmol) der nach Beispiel 27ab  
15 dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 353 mg (1,46  
mmol, 78%) der epimeren Titelverbindungen als farbloses Öl.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  = 0,71-1,09 (9H), 1,20-1,44 (2H), 1,44-1,78 (5H), 1,78-2,02 (5H),  
3,32-3,44 (1H), 3,51-3,60 (1H), 3,76 (1H), 3,80-4,02 (2H) ppm.

**Beispiel 27b**

20

**(4S)-4-(2-Methyl-1-oxo-prop-2-yl)-2,2-tetramethylen-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 9 setzt man 400 mg (1,87 mmol) der nach Beispiel 24c  
dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung 611 mg der Titelverbindung  
als gelbes Öl, die man ohne Reinigung weiter umsetzt.

25

**Beispiel 27c****(4S)-4-(2-Methyl-1-hydroxy-prop-2-yl)-2,2-tetramethylen-[1,3]dioxan**

In Analogie zu Beispiel 24c setzt man 997 mg (2,20 mmol) der nach Beispiel 27d  
30 dargestellten Verbindung um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 415 mg (1,94  
mmol, 88%) der Titelverbindung als farbloses Öl

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  = 0,90 (6H), 1,36 (1H), 1,53-2,02 (9H), 2,93 (1H), 3,39 (1H),  
3,55 (1H), 3,70 (1H), 3,87 (1H), 3,96 (1H) ppm.


**Beispiel 27d****(4S)-4-[2-Methyl-1-(tert.-butyldiphenylsilyloxy)-prop-2-yl]-2,2-tetramethylen-[1,3]dioxan**

5 In Analogie zu Beispiel 24d setzt man 1,00 g (2,59 mmol) der nach Beispiel 6 dargestellten Verbindung in 50 ml Toluol unter Verwendung von Cyclopentanon um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 997 mg (2,20 mmol, 85%) der Titelverbindung als farbloses Öl

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  = 0,84 (3H), 0,88 (3H), 0,99-1,10 (10H), 1,30 (1H), 1,50-1,99 (8H), 3,23 (1H), 3,60 (1H), 3,80-3,98 (3H), 7,31-7,49 (6H), 7,61-7,73 (4H) ppm.

## Patentansprüche

### 1. Verbindungen der allgemeinen Formel



(I)

5 worin

$\text{R}^1$  Wasserstoff,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{10}$ -Alkyl, Aryl oder  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{20}$ -Aralkyl,

$\text{R}^2$  Wasserstoff,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{10}$ -Alkyl, Aryl oder  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{20}$ -Aralkyl,

$\text{R}^3$   $\text{CH}_2\text{OH}$ ,  $\text{CH}_2\text{OR}$ ,

$\text{R}^4$  OH, OR,

wobei beide Reste R unabhängig voneinander eine beliebige Schutzgruppe oder gemeinsam eine  $-\text{CR}^7\text{R}^8$  Gruppe worin  $\text{R}^7$  und  $\text{R}^8$  gleich oder verschieden sind und


Wasserstoff,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkyl, Aryl oder gemeinsam eine  $-(\text{CH}_2)_n$ -Gruppe mit  $n = 2$  bis 6 bedeuten,

$\text{R}^5$  und  $\text{R}^6$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{10}$ -Alkyl,  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{10}$ -Aralkyl oder gemeinsam eine  $-(\text{CH}_2)_m$ -Gruppe mit  $m = 2$  bis 5 bedeuten,

und alle Stereoisomeren sowie deren Gemische eingeschlossen sind,

und wenn  $\text{R}^1 = \text{Wasserstoff}$  und  $\text{R}^2 = \text{Ethyl}$  oder umgekehrt,  $\text{R}^3 = \text{CH}_2\text{OR}$ ,  $\text{R}^4 = \text{OR}$ ,  $\text{R} = \text{CR}^7\text{R}^8$  und  $\text{R}^7 = \text{R}^8 = \text{Methyl}$  ist, dürfen  $\text{R}^5$  und  $\text{R}^6$  nicht Methyl bedeuten.

### 2. Verbindungen der Formel




(VIa)

worin  $\text{R}^5$  und  $\text{R}^6$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{10}$ -Alkyl,  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{10}$ -Aralkyl oder gemeinsam eine  $-(\text{CH}_2)_m$ -Gruppe mit  $m = 2$  bis 5, und

$\text{R}^9$  und  $\text{R}^{10}$  unabhängig voneinander Wasserstoff oder eine beliebige Schutzgruppe

bedeuten.


## 3. Verbindungen der Formel



(IXa)

- 5      worin  $R^5$  und  $R^6$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_7$ - $C_{10}$ -Aralkyl oder gemeinsam eine  $-(CH_2)_m$ -Gruppe mit  $m = 2$  bis 5, und  $R^9$ ,  $R^{10}$  und  $R^{11}$  unabhängig voneinander Wasserstoff oder eine beliebige Schutzgruppe
- 10     bedeuten.


## 4. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel (IIa)



(IIa)

- 15      worin  $R^1$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl, Aryl oder  $C_7$ - $C_{20}$ -Aralkyl,  $R^2$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl, Aryl oder  $C_7$ - $C_{20}$ -Aralkyl  $R^7$  und  $R^8$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl, Aryl oder gemeinsam eine  $-(CH_2)_n$ - Gruppe mit  $n = 2$  bis 6 bedeuten und
- 20      die Konfiguration am C3 (R), (S) oder ein Gemisch aus beiden sein kann, je nachdem welches Pantolacton oder Pantolacton-Gemisch für das Verfahren eingesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, daß
- in einem **Schritt 1**

25




(III)


(V)

die freie Hydroxygruppe des Pantolactons (III) unter wasserfreien Bedingungen mit 3,4-Dihydro-2H-pyran/p-Toluolsulfonsäure-Pyridiniumsalz (a) in den Tetrahydropyranylether (IV) überführt und das Lacton bei -70°C mit Diisobutylaluminiumhydrid (b) zum Lactol (V) reduziert wird,

5 in einem **Schritt 2**



10 das Lactol (V) mit Methyltriphenylphosphoniumbromid/Butyllithium ( c ) zur offenkettigen Verbindung (VI) geöffnet ,  
in einem **Schritt 3**




15

die freie primäre Hydroxygruppe mit tert.-Butyldiphenylsilylchlorid/Imidazol in Dimethylformamid (d) zur Verbindung (VII) mit zwei geschützten Hydroxygruppen umgesetzt wird und dann

20 entweder


in einem **Schritt 4**



25 der Tetrahydropyranylether unter Einwirkung von Pyridinium-p-Toluolsulfonat (e) gespalten wird, der Allylalkohol (VIII) einer Hydroborierung unter üblichen Bedingungen (f) unterworfen und das erhaltene 1,3-Diol (IX) durch Umsetzung mit einer Carbonylverbindung  $R^7COR^8$  als Ketal (X) geschützt (g) wird,  
oder



in einem **Schritt 4a**




5

zuerst eine Hydroborierung unter üblichen Bedingungen durchgeführt (x) und unter Einwirkung von Kupfer(II)sulfat/p-Toluolsulfonsäure und der Carbonylverbindung  $R^7COR^8$  (y) der Tetrahydropyranylether gespalten und das Ketal gebildet wird,


und

10 in einem **Schritt 5**



15 die Schutzgruppe der primären Hydroxygruppe der Verbindung (X) mit Tetrabutylammoniumfluorid (h) gespalten und der Alkohol (XI) mit Oxalylchlorid/Dimethylsulfoxid (i) zum Aldehyd (XII) oxidiert wird, und

in einem **Schritt 6**



20

der Aldehyd (XII) mit einer metallorganischen Verbindung der allgemeinen Formel


25



(k),

wobei  $R^1$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl, Aryl oder  $C_7$ - $C_{20}$ -Aralkyl,  
 $Y$  Lithium oder  $MgX$  und  
 $X$  Chlor, Brom oder Iod sein kann,

- 5 umgesetzt und der erhaltene Alkohol (XIII) mit Molekularsieb/ $N$ -Morpholino- $N$ -Oxid/Tetrapropylammoniumperruthenat (I) zum Keton (XIV) oxidiert wird,  
 und  
 gegebenenfalls in einem Schritt 7



mit Lithiumdiisopropylamid (LDA)/ $R^2Z$

- 15 wobei  $R^2$   $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl, Aryl oder  $C_7$ - $C_{20}$ -Aralkyl und  
 $Z$  eine geeignete Abgangsgruppe sein kann,

zu einer Verbindung (IIa) umgesetzt wird.

- 20 5. Verwendung von Verbindungen aus Anspruch 1 zur Synthese von Epothilon oder  
 Epothilonderivaten.
6. Verwendung der Verbindungen aus Anspruch 2 zur Synthese von Epothilon oder  
 Epothilonderivaten.
- 25 7. Verwendung der Verbindungen aus Anspruch 3 zur Synthese von Epothilon oder  
 Epothilonderivaten.
8. Verwendung von Pantolacton zur Herstellung von Vorstufen zur Synthese von  
 30 Epothilon oder Epothilonderivaten.
9. Verwendung von Pantolacton zur Synthese von Epothilon oder Epothilonderivaten.

## **Zusammenfassung**

5

Neue (C1-C6)-Fragmente, Verfahren zu ihrer Herstellung ausgehend von Pantolacton und ihre Verwendung zur Synthese von Epothilon und Epothilonderivaten.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**